



Questions sur les chauves-souris ?

(Extrait du [site Internet des Gorges du Daluis](#))

Une chauve-souris est entrée dans votre maison :

Qu'il est bon de dormir la fenêtre ouverte lors d'une belle nuit estivale... les chauves-souris ne vous contrediront pas ! Il est même possible que l'une d'elles vienne vous rendre visite pendant la nuit ! Pas de panique, vous briseriez toute la poésie d'une telle intrusion ! La chauve-souris est très curieuse et aime connaître son territoire. Tous les éléments paysagés font l'objet de prospections nocturnes méticuleuses, votre maison n'y échappe pas. Si la fenêtre de votre chambre est ouverte, elle peut y venir pour connaître ce nouvel espace. Ne craignez rien ! Elle tourne dans la pièce pour bien la cartographier, repérer d'éventuels points d'accroche et manger les moustiques qui s'y trouvent. Parfois, elle peut décider de se suspendre à une poutre pour se nettoyer ou dormir quelques minutes.

C'est alors le moment privilégié pour l'observer se faire une toilette ou... pour vous rendormir ! La chauve-souris partira d'elle-même après quelques instants. Ce n'est pas la peine de lui courir après, vous l'affoleriez, vous vous épuiseriez et stresseriez inutilement et vous en garderiez un mauvais souvenir. Le mieux est vraiment de ne pas bouger de son lit ! Si les visites sont trop fréquentes à votre goût, une simple moustiquaire à votre fenêtre règlera ce petit souci. S'il fallait absolument l'attraper, faites-le avec un tissu et avec délicatesse pour ne pas lui casser une aile. Une fois l'animal tenu, remettez-le dehors.

Une colonie s'est installée chez vous :

Parmi les 30 espèces qui sont répertoriées dans la région PACA, certaines aiment se nicher dans les habitations humaines. Cabanons, granges, maisons anciennes ou neuves sont autant de gîtes que les chauves-souris peuvent utiliser. Les femelles, qui ne mettent pas qu'un unique petit par an, recherchent des gîtes chauds. La température idéale étant de 25 à 28°C. Elles sont très exigeantes quant à la qualité du gîte et des chauves-souris qui logent entre les tuiles d'une toiture, comme les Pipistrelles, n'aimeront pas le grenier d'une vieille maison ou l'intérieur d'un cabanon. Ces derniers gîtes sont par contre très recherchés par le Petit rhinolophe, qui recherche des volumes importants (grenier) plutôt que des endroits exigus (derrière un volet, sous les tuiles).

Ultime gîte !

Il faut savoir que les chauves-souris sont malmenées par de nombreuses activités humaines. C'est ainsi que leur gîtes naturels disparaissent de plus en plus : l'abatage des arbres morts ou creux, l'arrachage des haies, le nettoyage des falaises qui surplombent une route ou qui sont équipées pour l'escalade, le foudroyage des anciennes mines, les incendies, les grands travaux "anti-inondation" dans les rivières et les ripisylves, l'aménagement des cabanons, granges et grenier en habitation, la sur-urbanisation... sont autant de facteurs qui font que de nombreuses espèces disparaissent de secteurs et de régions entières. Certaines ont comme ultime solution de se réfugier dans les habitations neuves...

De petits locataires responsables qui paient leur loyer

Les chauves-souris ne sont pas des rongeurs, elles ne s'attaqueront donc pas à vos fils électriques ou isolations. Elles ne font pas de nid et utilisent des espaces existants. Donc rien à craindre pour votre maison ! Souvent, vous trouverez par terre sur la terrasse ou sur le mur des petites crottes noires de la taille d'un grain de riz, c'est le guano de chauve-souris. Bien que cela puisse vous gêner, il faut savoir que c'est l'un des meilleurs engrais animal.

N'hésitez pas à le mettre dans vos plantes ou votre potager ! Il est composé de fins débris d'insecte riches en minéraux et est directement assimilable par la plante. Sa composition organique est : azote 12%, anhydride phosphorique 8% et oxyde de potassium 3%. Bien au delà d'une petite crotte, c'est un loyer en nature qu'elles vous payent !

Le guano vous gêne :

Dans le cas d'une colonie importante, il est possible que le guano soit quand même une gêne. Plusieurs cas sont possibles :

-la colonie est à l'intérieur du grenier : il y a en général un tas de guano sous les zones d'accrochage habituelles et des projections de quelques crottes ici et là. L'idéal est donc d'installer, quand les chauves-souris sont absentes, une bâche plastique sous leurs reposoirs habituels et des vieux draps sur les cartons ou meubles que vous voulez conserver propre, cela les protégera également de la poussière. La bâche plastique permettra de surcroît de récupérer plus facilement le guano. Sachez que certaines personnes qui n'ont pas l'utilité du guano, le donnent pour le compost municipal... attention, la récolte se fera lorsque les chauves-souris ont quitté le grenier, en septembre.

-la colonie est sous les tuiles : les Pipistrelles aiment se loger sous les tuiles des toitures et terrasses couvertes. Une colonie peut compter 20 ou 30 femelles. Une Pipistrelle pèse un demi-sucre, c'est-à-dire 4g ! Et elle mange l'équivalent de 3000 moustiques par nuit ! Si généralement elles sont discrètes et passent inaperçues, en été, les femelles allaitantes font des allers-retours entre leurs territoires de chasse et leur gîte pour allaiter leur unique bébé, ce qui peut vous donner l'impression d'être envahi. Lorsqu'elles logent sous votre toiture ou derrière la poutre qui est contre votre façade, le guano tombe le long du mur et il est très simple de faire un aménagement. Il suffit d'installer une planchette ou une gouttière à l'aplomb de là où se trouvent les animaux ou de l'entrée de leur cachette. Cette installation stoppera les crottes dans leur chute et évitera qu'elles ne tombent au bas de votre mur. Les crottes qui sont collées à la façade, se nettoient très bien avec un balai brosse. Elles partent facilement lors d'une pluie ou avec les jours qui passent.

Il est moins facile d'aménager la toiture d'une terrasse qui est occupée par une colonie, mais en mesure urgente, vous pouvez tendre un tissu là où tombe le guano. Il suffit de le tendre plus ou moins en fonction de votre préférence et de le fixer sur les chevrons avec des punaises par exemple. Ainsi, le guano sera retenu par le tissu et ne tombera plus sur votre salon d'été. Le guano sèche très vite et devient de la poussière, si nécessaire, vous pourrez "vider" le tissu toutes les 3 semaines environ. N'oubliez pas : mettez-le dans votre potager

ou vos fleurs. Et ne soyez pas inquiet, sous nos contrées, le guano ne présente absolument aucun souci pour la santé.

SOS chauves-souris

Vous avez trouvé une chauve-souris blessée qui n'arrive plus à s'envoler ? Vous avez trouvé un bébé chauve-souris non volant ?

Dans le cas d'une chauve-souris adulte blessée :

Une chauve-souris adulte se reconnaît par la présence d'une belle fourrure. De septembre à mi-juin, il est quasiment sûr que ce soit un adulte ou un jeune de l'année en âge de voler correctement.

Avant d'attraper l'animal blessé, préparez une boîte en carton (type boîte à chaussure). Percez la boîte de petits trous d'une taille inférieure à 5 mm pour que la chauve-souris puisse respirer. Attention, si les trous sont trop gros, la chauve-souris risque de partir. Dans la boîte, mettre un chiffon en boule pour qu'elle puisse s'accrocher dessus ou se cacher à l'intérieur. Important : il faut également mettre un couvercle de pot de confiture rempli d'eau. La chauve-souris, comme la plupart des mammifères, a besoin de boire régulièrement.

La récupération de l'animal blessé se fait avec un gant ou une serviette. La chauve-souris est inoffensive, mais si vous l'attrapez, son réflexe de survie fera qu'elle essaiera peut-être de vous mordre. C'est normal, c'est comme si l'on tentait de nous attraper dans la rue, notre réflexe serait alors de se défendre. Une fois l'animal capturé, il faut le mettre dans la boîte et fermer le couvercle. Disposez la boîte dans un endroit calme.

Et après ? il faut téléphoner à un centre de sauvegarde de la faune sauvage :

-Centre de Buoux (84) : 04 90 74 52 44

-Centre des Hautes-Alpes (05) : 04 92 54 74 31.

Dans le cas d'un bébé chauve-souris :

Entre mi-juin et mi-août, il est possible de trouver des bébés chauves-souris. Ils sont en général dépourvus de poils ou arborent un duvet plutôt sombre.

Le cas des bébés chauves-souris est complexe. Seule sa mère est capable de l'initier efficacement au vol et à la chasse. La récupération d'un bébé se fera donc dans le cas unique où la colonie n'a pu être localisée. En effet, il est possible que le bébé soit tombé de la colonie qui se trouve dans les parages immédiats de là où se trouve le bébé (rayon de 15m).

Ouvrez les yeux...

Regardez la façade et repérez les gîtes potentiels : derrière des volets, sous les tuiles de la toiture de la terrasse, au niveau des génoises, dans la fissure d'une poutre, dans la fissure

d'un mur, dans le joint de dilatation du bâtiment et tout autre interstice. Regardez bien si vous ne voyez pas des petites crottes noires sur le mur ou par terre. Les crottes de chauves-souris sont grosses comme un grain de riz. Vous pouvez également observer le soir ou le matin pour observer les chauves-souris sortir ou entrer dans leur gîte.

...et les oreilles en grand !

Ecoutez bien si vous n'entendez pas des petits cris stridents. Souvent les Pipistrelles communiquent entre elles par des sons audibles, elles font un genre de cricricri...

Si vous localisez la colonie :

C'est le cas où le jeune aura la plus grande chance de survie. En fonction de là où se trouve le bébé, déplacez-le pour le remettre proche de la colonie. Ne jamais remettre le jeune dans la colonie, votre présence risquerait de faire fuir les chauves-souris. Si les femelles sont derrière un volet, remettez le jeune dessous (de 50 cm à 2m). Eloignez-vous et observez de loin. Le jeune devrait remonter et pousser des petits cris. A un certain moment, sa mère devrait sortir de derrière le volet et venir le chercher. A ce moment-là, vous pouvez vous réjouir car le jeune est sauvé. Parfois il faut attendre le soir, lorsque les mères sortent, pour qu'elles viennent chercher leurs rejetons. Si la colonie est inaccessible, vous pouvez mettre le jeune dans un petit panier qui sera placé proche de l'endroit où vous pensez qu'il y a la colonie (vous pouvez vous aider d'une échelle pour le suspendre en hauteur).

Si vous ne localisez pas la colonie :

Appelez un centre de soin (voir les informations ci-dessus). La seule nourriture à donner à un bébé est du lait pour nourrisson 1er âge. Bannissez absolument le lait de vache ou tout autre nourriture.