

Le Damier de la succise (*Euphydryas aurinia* [Rottembourg, 1775])

Lepidoptera Nymphalidae



Code Natura 2000 : 1065

## STATUTS

**En Annexe II de la Directive Habitats**

**En Annexe 2 de la Convention de Berne**

**Espèce protégée en France**

**Espèce classée comme « en danger »** dans l'Inventaire de la Faune menacée en France, le livre rouge

## HABITAT

Il diffère selon les sous-espèces :

- Clairières sèches et bois clairs pour la sous-espèce *provincialis* que l'on rencontre en moyenne montagne. Les chenilles se nourrissent de Céphalaires, de Centranthes et aussi de Scabieuses.
- Pelouses humides, lisières herbues de bois clairs, landes humides, pour la sous-espèce nominale *aurinia*, que l'on rencontre plutôt en plaine. Les chenilles se nourrissent de Scabieuses et de Chèvrefeuilles.

## REPARTITION

---

Toutes sous-espèces confondues, la répartition de ce papillon couvre toute l'Europe et s'étend vers l'est jusqu'en Corée. Présent dans les Balkans mais absent de l'est de la Méditerranée, il se limite principalement aux montagnes du centre et du sud de l'Italie.

En France la sous-espèce *aurinia* est encore présente presque partout bien qu'en forte régression. Elle peut se révéler abondante localement. La sous-espèce *beckeri* est confinée en France, aux Pyrénées-Orientales. La sous-espèce *provincialis* n'est présente qu'en P.A.C.A., débordant légèrement au nord de cette région et en Italie. La sous-espèce *debilis* (séparée en deux sous espèces : *frigescens* et *glaciegenita* par certains auteurs) est une montagnarde (Alpes et Pyrénées) que l'on rencontre rarement au dessous de 1800 m d'altitude.

## DESCRIPTION ET ECOLOGIE DE L'ESPECE

---

Ornementation caractéristique en damier orange et fauve. Se distingue des autres Damiers (genre *Euphydryas*) et de la plupart des Mélitées (genres *Melitaea* et *Mellicta*), par la présence d'une série complète de points noirs dans la bande post-discale de l'aile postérieure.

Se différencie des autres Mélitées, par l'ornementation caractéristique en damier (plus uniforme chez les Mélitées), et par le dessin du dessous des ailes légèrement flou. Les sexes sont presque semblables, mais les mâles sont plus contrastés et plus petits. La taille de l'aile antérieure varie de 15 à 25 mm.

Cette espèce est en voie de différenciation en sous-espèces présentes en France : *aurinia*, *beckeri*, *provincialis*, *debilis* (ou *frigescens* et *glaciegenita*). La photo ci-dessus présente la sous-espèce *provincialis* présente sur le site d'étude.

Les adultes volent de mai à mi juillet, en une seule génération.